

Σε έναν εμμηνορυσιακό κύκλο, η ωρίμανση πολλαπλών ωρίων επιτυγχάνεται μετά από τη λήψη ορισμένων ορμονικών σκευασμάτων.

Ενδείξεις

Από το σύζυγο:

- Ολιγοασθενοσπερμία

Επί παθολογικού σπερμοδιαγράμματος επιτυγχάνονται μεγαλύτερα ποσοστά κυήσεων μόνο όταν υποβοηθήσουμε την απλή ωοθυλακιορρηξία με το να χορηγήσουμε σκευάσματα τέτοια που να έχουμε πολλαπλή ωοθυλακιορρηξία στη σύζυγο.


Από τη σύζυγο:

- Ανωμαλίες του κύκλου
- Πολλαπλοί ανωθυλακιορρηκτικοί κύκλοι
- Ασυγχρόνιστη ωοθυλακιορρηξία
- Ανεπάρκεια ωχρού σωματίου

Διάγνωση

Πριν τη φαρμακευτική αγωγή είναι απαραίτητη η ορμονική διερεύνηση των ανωμαλιών του εμμηνορυσιακού κύκλου.

- Αποκλεισμός της υπερπρολακτιναιμίας
- Διερεύνηση των γοναδοτροπινών (FSH, LH)
- Αποκλεισμός της υπερανδρογοναιμίας (π.χ. πολυκυστικές ωοθήκες, τεστοστερόνη, DHEA-S)
- Διερεύνηση της λειτουργίας του θυρεοειδούς (TSH, f T3, fT4)
- Διάγνωση της πιθανής αντίστασης στην ινσουλίνη



Ενδομήτρια σπερματέγχυση από την επεξεργασία του σπέρματος μέχρι την ενδομήτρια έγχυση